レジメン名	CBDCA+PEM+BV					
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	3週間
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	91.2%	G-CSF投与
	血小板減少	4.8%	輸血
	発熱性好中球減少	8.8%	抗菌薬の投与、G-CSF投与
その他	高血圧	11.2%	降圧薬の投与
	食欲不振	5.6%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	生食 プロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																				
3	デキサート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	アリムタ 生食	500mg/㎡ 100mL	点滴静注	500mL/h		●																				
5	カルボプラチン 5%　ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h		●																				
6	アバスチン 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分		●																				
7	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg	朝・昼食後				●●	●●																		
2	５－HT_3受容体拮抗薬					●																				