レジメン名	CBDCA+TS-1										
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度						
				1コースの日数	3週間						
				投与予定回数	3~4コース						
内服抗がん剤の有無				投与回数上限							
※有の場合薬剤名											

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)											
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)								
血液毒性	好中球減少	58.3%	G-CSFの投与								
	貧血	86.7%	輸血								
	血小板減少	87.4%	輸血								
その他	悪心	62.4%	制吐剤の使用								
	嘔吐	34.1%	制吐剤の使用								

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	2 :	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	p 薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
	1 生食	50mL	点滴静注	100mL/h		•																				
	2 プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		•																				
	3 デキサート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	200mL/h		•																				
	4 5% ブドウ糖注 カルボプラチン	250mL AUC=5	点滴静注	1時間		•																				
	5 生食	50mL	点滴静注	100mL/h		•																				

内服抗がん剤・支持療法薬

R	Rp 薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1 エスワン	1回40mg/m²	1日2回		••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••							
	2 デカドロン	1回4mg	朝·昼食後			••	••																		
	3 5-HT3受容体拮抗薬				•																				