レジメン名	CBDCA+VP-16+Atezolizumab				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	3週間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	劇症1型糖尿病		
	重症菌無力症		

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●	●	●																		
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	初回投与時 1時間 2回目以降は 500mL/h		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	生食 プロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																				
5	生食 デキサート アロキシ	50mL 9.9mg 0.75mg	点滴静注	200mL/h		●																				
6	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=5 250mL	点滴静注	125mL/h		●																				
7	ソルデム3A エトポシド	500mL 100mg/m2	点滴静注	3時間		●	●	●																		
8	ソルデム3A プリンペラン注	500mL 10mg	点滴静注	250mL/h		●	●																			
9	ヘパリンNaロック	10単位	静注			●	●																			
10	生食	50mL	点滴静注	100mL/h				●																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg 2錠	朝・昼食後				●●	●●																		