レジメン名	CBDCA+nab-PTX				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	59.1%	G-CSF投与
	血小板減少	44.7%	輸血
	貧血	48.8%	
その他	末梢神経障害	45.5%	ビタミン剤、漢方等併用
	悪心・嘔吐	10.1%	制吐剤の使用

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●						
2	生食 ブロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	生食 デキサート	50mL 6.6mg	点滴静注	100mL/h									●							●						
5	生食 アロキシ デキサート	50mL 0.75mg 4.95mg	点滴静注	100mL/h		●																				
6	アプラキサン 生食	100mg/㎡ 20mL/㎡	点滴静注	30分		●							●							●						
7	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
8	カルボプラチン 5%　ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	1時間		●																				
9	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg　2錠	朝・昼食後				●●	●●																		