レジメン名	CDDP+VNR				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	3～4週間
				投与予定回数	3～4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	25.0%	
	貧血	43.0%	
その他	悪心	33.0%	
	嘔吐	29.0%	
	便秘	40.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													
2	ラクテック	500mL	点滴静注	day1 250mL/h day2 100mL/h		●	●																			
3	ラクテック	500mL	点滴静注	250mL/h		●																				
4	プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
5	デキサート アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
6	ロゼウス 生食	25mg/㎡ 50mL	点滴静注	500mL/h		●							●													
7	20%マンニットール	300mL	点滴静注	300mL/h		●																				
8	シスプラチン 生食	80mg/㎡ 250mL	点滴静注	1時間30分		●																				
9	ソルデム3A	500mL	点滴静注	day1 167mL/h day2 100mL/h		●	●																			
10	ソルデム3A	500mL	点滴静注	125mL/h		●																				
11	生食	250mL	点滴静注	500mL/h									●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg 2錠	朝、昼食後				●●	●●																		