レジメン名	A+AVD				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	250mL	点滴静注	50mL/h		●														●													
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●														●													
3	デキサート アロキシ 生理食塩液	9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	216mL/h		●														●													
4	ドキソルビシン 生理食塩液	25mg/m^2 50mL	点滴静注	500mL/h		●														●													
5	エクザール 生理食塩液	6mg/m^2 50mL	点滴静注	500mL/h		●														●													
6	ダカルバジン 注射用水	375mg/m^2 100mL	点滴静注	100mL/h		●														●													
7	生理食塩液	500mL	点滴静注	500mL/h		●														●													
8	アドセトリス 注射用水 生理食塩液	1.2mg/kg 0.24mL/kg 100mL（※）	点滴静注	200mL/h		●														●													
9	生理食塩液	50mL	点滴静注	200mL/h		●														●													

※最終濃度が1.2mg/mLを超える場合は生理食塩液は250mLとすること

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン錠	8mg/day					●●	●●													●●	●●											