

レジメン名	FOLFIRINOX				
対象がん種	膵がん	対象患者	催吐リスク	高度	
			1コースの日数	14日間	
			投与予定回数	PDまで	
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	
	血小板減少	
	貧血	
その他	下痢	
	末梢神経障害	
	嘔吐	

レジメン内容(支持療法を含む)

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)									休業完了
1	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h	●									
2	プロイメンド 生食	150 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h	●									
3	デキササート パロノセトロン 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h	●									
4	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	●									
5	イリノテカン ブドウ糖注5%	180 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間	●									
6	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h	●									
7	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h										
8	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL	持続静注	46時間	●									

内服抗がん剤・支持療法薬

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	用法											
1	テカドロン錠	8mg/day	内服		●●	●●								

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

200 ml/h

②
点滴静注

プロイメンド 生食	150 mg 100 mL
--------------	------------------

200 ml/h

③
点滴静注

デキササート パロノセトロン 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL
-------------------------	-----------------------------

200 ml/h

④
点滴静注

オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL
---------------------	--------------------------------

2時間

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤
点滴静注

イリノテカン ブドウ糖注5%	180 mg/m ² 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要
側管①と同時投与

⑥
点滴静注

フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑦
持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL
----------------	------------------------------------

46時間

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 ml/h
主管⑤と同時投与