

レジメン名	nal-IRI+5-FU_LV				
対象がん種	膵がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14日間
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし			投与予定回数	PDまで
				投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度%(grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	
	血小板減少	
その他	下痢	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														休薬完了
2	デキササート パロノセトロン 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	オニバイド ブドウ糖注5%	70 mg/m ² 500 mL	点滴静注	90分			●														
4	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														
5	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
6	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	内服			●●	●●											

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

② 点滴静注

デキササート	9.9 mg
パロノセトロン	0.75 mg
生食	100 mL

200 ml/h

③ 点滴静注

オニバイド	70 mg/m ²
ブドウ糖注5%	500 mL

90分

④ 点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

⑤ 点滴静注

レボホリナート	200 mg/m ²
ブドウ糖注5%	250 mL

125 ml/h

⑥ 持続静注

フルオロウラシル	2400 mg/m ²
生食	全量100 mL

46時間

炎症性
フィルター不可
バッグは遮光、ルートは遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要