

レジメン名	FOLFIRI				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	PDまで
※有の場合薬剤名				投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%) (Grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	24.0%	
	貧血	3.0%	
その他	悪心	13.0%	
	下痢	14.0%	開始前UGT1A1遺伝子多型確認検討
	粘膜炎	10.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														休業完了
2	デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●														
4	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
5	フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
6	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-HT3阻害薬(アロキン注、カイトリル錠など)				●													
2	デカドロン錠	8mg/day	分2または分1			●●	●●											

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注	
生食	50 mL
100 mL/h	

②

点滴静注	
デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
200 mL/h	

③

点滴静注	
イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL
2時間	

④

点滴静注	
フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL
200 mL/h	

⑤

持続静注	
フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL
46時間	

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要
側管①と同時投与

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注	
レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL
125 mL/h	

主管③と同時投与