

レジメン名	FOLFIRI+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度%(Grade≥3)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	53.6%	
その他	高血圧	12.5%	
	下痢	10.7%	開始前UGT1A1遺伝子多型確認検討

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														休薬完了
2	デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	アバスチン 生食	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分			●														
4	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●														
5	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
6	フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5-HT3阻害薬(アロキシ注、カイトリル錠など)				●														
2	デカドロン錠	8mg/day	分2または分1			●●	●●												

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

②
点滴静注

デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
-----------------------	---------------------------

200 mL/h

③
点滴静注

アバスチン 生食	5 mg/kg 100 mL
-------------	-------------------

備考欄参照

④
点滴静注

イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

⑤
点滴静注

フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 mL/h

⑥
持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL
----------------	---------------------------------------

46時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降
30分
終了後生食フラッシュ

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要
側管①と同時投与

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 mL/h

主管④と同時投与

