

レジメン名	FOLFIRI+Cmab			
対象がん種	大腸がん	対象患者	嘔吐リスク	中等度
			1コースの日数	14
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	PDまで
※有る場合薬剤名			投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (Grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	28.2%
その他	皮膚反応	19.7%
	下痢	15.7%
	嘔吐	4.7%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●							●							休業完了
2	デキササート ボラミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	デキササート ボラミン 生食	6.6 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h										●							
4	アービタックス 生食	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間			●							●							
5	生食	100 mL	点滴静注	100 mL/h										●							
6	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●														
7	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
8	フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
9	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-HT3阻害薬(アロキシン注、カイトリル錠など)				●													
2	デカドロン錠	8mg/day	分2または分1			●●	●●											

滴下順

day 1

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

②

点滴静注

デキササート ボラミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 mL
----------------------	--------------------------

200 mL/h

③

点滴静注

アービタックス 生食	250 mg/m ² 250 mL
---------------	---------------------------------

1時間

④

点滴静注

イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

⑤

点滴静注

フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 mL/h

⑥

持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL
----------------	---------------------------------------

46時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要
側管①と同時投与

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

day 1

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 mL/h

主管④と同時投与

day 8

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

②

点滴静注

デキササート ボラミン 生食	6.6 mg 5 mg 100 mL
----------------------	--------------------------

200 mL/h

③

点滴静注

アービタックス 生食	250 mg/m ² 250 mL
---------------	---------------------------------

1時間

④

点滴静注

生食	100 mL
----	--------

100 mL/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要