

レジメン名	FOLFIRI+Pmab			
対象がん種	大腸がん	対象患者	催吐リスク	中等度
			1コースの日数	14
			投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度%(Grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少 20.0%	
その他	皮膚反応 37.0%	開始前UGT1A1遺伝子多型確認検討
	下痢 14.0%	
	低Mg血症 3.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h	投与時刻(必要時)	●														休業完了
2	デキササート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●														
3	ベクティビックス 生食	6 mg/kg 100 mL	点滴静注	1時間		●														
4	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間		●														
5	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	125 mL/h		●														
6	フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	200 mL/h		●														
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m <sup>2</sup> total 100 mL	持続静注	46時間		●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	5-HT3阻害薬(アロキシ注、カイトリル錠など)				●														
2	デカドロン錠	8mg/day	分2または分1			●●	●●												

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

② 点滴静注

デキササート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
------------------------	---------------------------

200 mL/h

③ 点滴静注

ベクティビックス 生食	6 mg/kg 100 mL
----------------	-------------------

1時間

④ 点滴静注

イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

⑤ 点滴静注

フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 mL/h

⑥ 持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m <sup>2</sup> total 100 mL
----------------	----------------------------------------

46時間

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグは遮光、ルートは遮光不要  
側管①と同時投与

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 mL/h

主管④と同時投与