

レジメン名	FOLFIRI+ZAL			
対象がん種	大腸がん	対象患者	催吐リスク	中等度
			1コースの日数	14日間
			投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%) (Grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	36.7%	
その他	下痢	19.3%	
	高血圧	19.3%	
	無力症	16.8%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														休業完了
2	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	ザルトラップ 生食	4 mg/kg 100 mL	点滴静注	1時間			●														
4	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間 レボホリナートと 同時投与			●														
5	レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h イリノテカンと 同時投与			●														
6	フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	内服			●●	●●											

滴下順

主管
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②
点滴静注

デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL
-------------------------------	--------------------------------------

200 ml/h

③
点滴静注

ザルトラップ 生食	4 mg/kg 100 mL
--------------	-------------------

1時間

軽度起炎症性
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要

④
点滴静注

イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要
側管①と同時投与

⑤
点滴静注

フルオロウラシル 5%ブドウ糖注	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑥
持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² total 100mL
----------------	---------------------------------------

46時間

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

レボホリナート 5%ブドウ糖注	200 mg/m ² 250 mL 125 ml/h
--------------------	---

主管④と同時投与

