

| レジメン名 | FOLFOX | | | | |
|-----------|--------|------|--|---------|------|
| 対象がん種 | 大腸がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 14日間 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与予定回数 | PDまで |
| | | | | 投与回数上限 | なし |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 項目 | 頻度%(Grade≥3) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 好中球減少 | 32.6% |
| | 血小板減少 | 3.4% |
| その他 | 末梢神経障害 | 14.4% |
| | 下痢 | 9.7% |
| | アレルギー反応 | 4.7% |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----------------------|------------------------------------|------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50 mL | 静注 | 100 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | デキサート プリンペラン 生食 | 9.9 mg 10 mg 100 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | レボホリナート ブドウ糖注5% | 200 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 125 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | オキサリプラチン ブドウ糖注5% | 85 mg/m ² 250 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | フルオロウラシル ブドウ糖注5% | 400 mg/m ² 50 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | フルオロウラシル 生食 | 2400 mg/m ² 全量100 mL | 持続静注 | 46時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----------------------|---------|----------|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|
| 1 | 5-HT3拮抗薬(カイトリル又はアロキシ) | | 内服or点滴静注 | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デカドロン錠 | 8mg/day | 内服 | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

| | |
|----|-------|
| 生食 | 50 mL |
|----|-------|

100 ml/h

②

点滴静注

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| デキサート プリンペラン 生食 | 9.9 mg 10 mg 100 mL |
|-----------------------|---------------------------|

200 ml/h

③

点滴静注

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| オキサリプラチン ブドウ糖注5% | 85 mg/m ² 250 mL |
|---------------------|--------------------------------|

2時間

④

点滴静注

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| フルオロウラシル ブドウ糖注5% | 400 mg/m ² 50 mL |
|---------------------|--------------------------------|

200 ml/h

⑤

持続静注

| | |
|----------------|------------------------------------|
| フルオロウラシル 生食 | 2400 mg/m ² 全量100 mL |
|----------------|------------------------------------|

46時間

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

側管①と同時投与

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| レボホリナート ブドウ糖注5% | 200 mg/m ² 250 mL |
|--------------------|---------------------------------|

125 ml/h

主管③と同時投与

