

<b>レジメン名</b>	<b>FOLFOX+Pmab</b>			
対象がん種	大腸がん	対象患者	催吐リスク	中等度
			1コースの日数	14日間
			投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
	項目	頻度(%) (grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	42.0%	
その他	皮膚障害	36.0%	
	低マグネシウム血	6.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●														休薬完了
2	デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●														
3	ペクティビックス 生食	6 mg/kg 100 mL	点滴静注	1時間		●														
4	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	125 mL/h		●														
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間		●														
6	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴静注	200 mL/h		●														
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m <sup>2</sup> 全量100 mL	持続静注	46時間		●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-HT3拮抗薬(カイトリル又はアロキシ)		内服or点滴静注		●													
2	デカドロン錠	8mg/day	分2または分1			●●	●●											

滴下順

**主管**

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②  
点滴静注

デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
-----------------------	---------------------------

200 ml/h

③  
点滴静注

ペクティビックス 生食	6 mg/kg 100 mL
----------------	-------------------

1時間

④  
点滴静注

オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL
---------------------	--------------------------------

2時間

⑤  
点滴静注

フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 ml/h

⑥  
持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m <sup>2</sup> 全量100 mL
----------------	------------------------------------

46時間

軽度起炎症性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要  
側管①と同時投与

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

**側管**

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 ml/h

主管④と同時投与