

レジメン名	FOLFOXIRI				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	14日間
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	PDまで
				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度%(grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	50.0%
その他	嘔吐	4.4%
	無力症	5.2%
	口内炎	8.8%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●														休薬完了
2	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●														
3	イリノテカン ブドウ糖注5%	165 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間		●														
4	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h		●														
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間		●														
6	フルオロウラシル 生食	3200 mg/m ² 全量100 mL 又は230 mL	持続静注	46時間		●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	デカドロン錠	8mg/day	内服			●●	●●												

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

①
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②
点滴静注

デキサート	9.9 mg
アロキシ	0.75 mg
プリンペラン	10 mg
生食	100 mL

200 ml/h

③
点滴静注

イリノテカン	165 mg/m ²
ブドウ糖注5%	250 mL

1時間

④
点滴静注

オキサリプラチン	85 mg/m ²
ブドウ糖注5%	250 mL

2時間

⑤
持続静注

フルオロウラシル	3200 mg/m ²
生食	全量100 mL 又は230 mL

46時間

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
側管①と同時投与

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

①
点滴静注

レボホリナート	200 mg/m ²
ブドウ糖注5%	250 mL

125 ml/h

フィルム
遮光
備考

主管④と同時投与