

ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日	測定日	測定日	測定日			
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEX	@PATIENTBIRTH	INTAGEFOR	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_U	kg	#VALUE!	m ²	@USERNAME
					\$HEIGHT02_Doc		\$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	IRIS+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	S-1				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少症	4.8%
	好中球減少	36.2%
	貧血	10.0%
その他	下痢	20.5%
	食欲不振	11.0%
	口内炎	2.9%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●																				休薬完了
2	デキササート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●																				
3	アバステン 生食	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分まで短縮可			●																				
4	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	S-1	80-120mg/day	内服		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●								
2	テカドロン錠	8 mg/day	内服			●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

② 点滴静注

デキササート	9.9 mg
アロキシ	0.75 mg
プリンペラン	10 mg
生食	100 mL

200 ml/h

③ 点滴静注

アバステン	7.5 mg/kg
生食	100 mL

備考欄参照

④ 点滴静注

イリノテカン	150 mg/m ²
5%ブドウ糖注	250 mL

2時間

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降
30分まで短縮可
終了後生食フラッシュ

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要