| レジメン名 | IRIS+Pmab | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 大腸がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 28日間 |
| | | | | 投与予定回数 | PDまで |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | なし |
| ※有の場合薬剤名 | S-1 | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他 | | | |
| | | | |
| | | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デキサート<br>アロキシ<br>プリンペラン<br>生食 | 9.9 mg<br>0.75 mg<br>10 mg<br>100 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベクティビックス<br>生食 | 6 mg/kg<br>100 mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | イリノテカン<br>5%ブドウ糖注 | 125 mg/㎡<br>250 mL | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50 mL | 点滴静注 | 200 mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | 80-120mg/day | 内服 | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デカドロン錠 | 8 mg/day | 内服 | | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 滴下順 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| **主管** | | | | | |
| 投与方法 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 |
| 薬剤・用量 | 生食 50 mL | デキサート 9.9 mg<br>アロキシ 0.75 mg<br>プリンペラン 10 mg<br>生食 100 mL | ベクティビックス 6 mg/kg<br>生食 100 mL | イリノテカン 150 mg/㎡<br>5%ブドウ糖注 250 mL | 生食 50 mL |
| 投与速度/時間 | 200 ml/h | 200 ml/h | 1時間 | 2時間 | |
| 投与時刻(必要時) | | | | | |
| 漏出時リスク | | | 軽度起炎症性 | 炎症性 | |
| フィルター | | | フィルター必要 | フィルター不要 | |
| 遮光 | | | バッグ、ルートともに遮光不要 | ッグは遮光、ルートは遮光不要 | |
| 備考 | | | 終了後生食フラッシュ | | |