

レジメン名	IRIS				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	S-1				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少症	4.8%
	好中球減少	36.2%
	貧血	10.0%
その他	下痢	20.5%
	食欲不振	11.0%
	口内炎	2.9%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●																				休薬完了
2	デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●																				
3	イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	2時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	S-1	80-120mg/day	内服		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●								
2	5-HT3拮抗薬(カイトリル又はアロキシ)		内服or点滴静注		●																					
3	テカドロン錠	8 mg/day	内服			●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

②  
点滴静注

デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
-----------------------	---------------------------

200 mL/h

③  
点滴静注

イリノテカン 5%ブドウ糖注	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL
-------------------	---------------------------------

2時間

炎症性  
フィルター不要  
バッグは遮光、ルートは遮光不要