

レジメン名	SOX+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	あり			投与予定回数	PDまで
	S-1			投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)(grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	9.0%
	血小板減少	4.0%
	貧血	5.0%
その他	下痢	9.0%
	高血圧	6.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 mL		100 mL/h			●																				休薬完了
2	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL		200 mL/h			●																				
3	アバステン 生食	7.5 mg/kg 100 mL		初回90分 2回目60分 3回目以降30分まで短縮可			●																				
4	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m ² 500 mL		2時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	S-1	80-120mg/day	内服		●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	8 mg/day	内服			●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 mL/h

②

点滴静注

デキサート	9.9 mg
アロキシ	0.75 mg
プリンペラン	10 mg
生食	100 mL

200 mL/h

③

点滴静注

アバステン	7.5 mg/kg
生食	100 mL

備考欄参照

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可

④

点滴静注

オキサリプラチン	130 mg/m ²
ブドウ糖注5%	500 mL

2時間

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要