

レジメン名	XELOX				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	カベシタピン				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	50.0%
	血小板減少	33.3%
その他	悪心	6.0%
	知覚神経障害	100.0%
	手足症候群	66.7%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			•																				休薬完了
2	デキササート アロキシ 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			•																				
3	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間			•																				
4	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			•																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	カベシタピン	1000 mg/m ² /回	朝/夕		•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	•							
2	デカドロン錠	8 mg/day	朝/昼			••	••																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②
点滴静注

デキササート	9.9 mg
アロキシ	0.75 mg
生食	100 mL

200 ml/h

③
点滴静注

オキサリプラチン	130 mg/m ²
ブドウ糖注5%	500 mL

2時間

④
点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要