

レジメン名	XELOX+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり		投与回数上限	なし	
※有の場合薬剤名	カベシタピン				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	51.7%
	血小板減少	22.4%
	貧血	5.2%
その他	手足症候群	77.6%
	発疹	27.6%
	高血圧	25.9%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●																				休薬完了
2	デキサート アロキシ 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●																				
3	アバスチン 生食	7.5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分 まで短縮可			●																				
4	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間			●																				
5	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	カベシタピン	1000 mg/m ² /回	朝/夕		●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●						
2	デカドロン錠	8 mg/day	朝/昼			●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

生食	50 mL
	100 ml/h

② 点滴静注

デキサート アロキシ 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL
	200 ml/h

③ 点滴静注

アバスチン 生食	7.5 mg/kg 100 mL
	備考欄参照

④ 点滴静注

オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m ² 500 mL
	2時間

⑤ 点滴静注

生食	50 mL
	100 ml/h

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降30分
まで短縮可
終了後生食フラッシュ

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要