

レジメン名	G-SOX				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	あり			投与予定回数	PDまで
	TS-1			投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h			●																				休薬完了
2	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9mg 0.75mg 10mg 100ml	点滴静注	200ml/h			●																				
3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖注	130mg/m ² 500ml	点滴静注	2時間			●																				
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	S-1	80mg/m ² /day	朝・夕食後		●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

滴下順

主警

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50ml
----	------

100 ml/h

②
点滴静注

デキサート	9.9mg
アロキシ	0.75mg
プリンペラン	10mg
生食	100ml

200 ml/h

③
点滴静注

オキサリプラチン	130mg/m ²
5%ブドウ糖注	500ml

2時間

④
点滴静注

生食	50ml
----	------

200 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要