

レジメン名		PTX+BV			
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (Grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少	0.8%
		0.0%
		0.0%
その他	高血圧	14.8%
	神経障害	23.5%
	過敏症	3.3%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●																							
2	デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●							●																							
3	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●																							
4	バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●							●																							
5	アバスチン 生食	10 mg/kg 100 ml	点滴静注	初回90分、2回目 60分、3回目以降 30分まで短縮可 能			●																														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	なし																																				

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
-----------------------------	----------------------------------

300 ml/h

③

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

④

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

⑤

アバスチン 生食	10 mg/kg 100 ml
-------------	--------------------

備考欄参照

起壊死性
フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要

終了後生食フラッシュ

軽度炎症性
フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

初回90分、2回目60分、3回目以降
30分まで短縮可能

day 8

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
-----------------------------	----------------------------------

300 ml/h

③

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

④

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

起壊死性
フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要

終了後生食フラッシュ