レジメン名	GC+BEV				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	10
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少症	20.6%	
	発熱性好中球減少症	1.6%	
	中枢神経系以外の出血	5.7%	
その他	高血圧	17.4%	
	蛋白尿	8.5%	
	静脈血栓塞栓症	4.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													
2	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●							●													
3	ゲムシタビン 生食	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	200mL/h		●							●													
4	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC：4 250mL	点滴静注	1時間		●																				
5	アバスチン 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分		●																				
6	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン	2mg/day	投与前内服			●																				