レジメン名	GEM+BEV				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													
2	ゲムシタビン 生食	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	200mL/h		●							●													
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	アバスチン 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分		●																				
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									