レジメン名	PLD+BV				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●														●												
2	デキサート 生食	9.9mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																										
3	ドキシル 5%ブドウ糖	40mg/㎡ 250mL	点滴静注	200mL/h		●																										
4	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																										
5	アバスチン 生食	10mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 3回目以降30分		●														●												
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●														●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															