レジメン名	Bu+ TT				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	9 days
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	78.9%	抗菌薬、G-CSF製剤、輸血
その他	粘膜障害	81.0%	口腔ケア、オピオイド
	神経精神系	47.0%	抗痙攣薬の予防投与
	感染症	44.0%	抗菌薬、G-CSF製剤

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1 (-8)	2 (-7)	3 (-6)	4 (-5)	5 (-4)	6 (-3)	7 (-2)	8 (-1)	9 (0)
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)									休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●	●	●			
3	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●								
2	アロキシ 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●								
4	ブスルフェクス 生理食塩液	3.2mg/kg 3.2 x BW x 5/3 mL	点滴静注	3hr		●	●	●	●					
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●					
6	リサイオ 生理食塩液	5mg/kg 500mL	点滴静注	2hr						●	●			
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr						●	●			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	カイトリル	2mg	投与前内服							●	●			
2	デパケンR	200mg	day -10から内服			●●	●●	●●	●●	●●	●●			
3	ビクロックス	200mg	内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	ウルソ	200mg	内服			●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
5	ダイフェン	1T	生着後から内服											
6	フルコナゾールなど	200mg	内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	レボフロキサシンなど	500mg	内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●