| レジメン名 | 大量MTX（3.5g/m2、2時間） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 悪性リンパ腫 | 対象患者 | | 催吐リスク | 高度 |
| | | | | 1コースの日数 | 14 days |
| | | | | 投与予定回数 | 2 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | 2 |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | 骨髄抑制 | 頻度不明 | 抗菌薬、輸血など |
| | | | |
| | | | |
| その他 | 食欲不振 | 77.0% | |
| | 嘔気 | 71.2% | |
| | ALT上昇 | 43.7% | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | プロイメンド<br>生理食塩液 | 150mg<br>100mL | 点滴静注 | 200mL/hr | 09:00:00 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | アロキシ<br>生理食塩液 | 0.75mg<br>50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | 09:30:00 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | メソトレキセート<br>生理食塩液 | 3.5g/m2<br>500mL | 点滴静注 | 2hr | 10:00:00 | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ロイコボリン<br>生理食塩液 | 12mg<br>20mL | 静注 | iv | 04:00:00 | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 7 | ロイコボリン<br>生理食塩液 | 12mg<br>20mL | 静注 | iv | 10:00:00 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 8 | ロイコボリン<br>生理食塩液 | 12mg<br>20mL | 静注 | iv | 16:00:00 | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 9 | ロイコボリン<br>生理食塩液 | 12mg<br>20mL | 静注 | iv | 22:00:00 | | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 12 | その他、重曹入りの補液（2000mL/m2）を行い、MTX開始12時間前からダイアモックス1TあるいはIvMTX濃度が低下するまで、1日2～3回続ける | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | |