レジメン名	CDDP+VP-16+Durvalumab				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	高度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	41.9%	延期、減量、G-CSF投与
	貧血	38.5%	
	血小板減少	15.5%	
その他	悪心	33.6%	制吐剤投与
	脱毛	31.3%	
	食欲減退	18.1%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分		●	●	●																		
2	イミフィンジ 生理食塩水	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	プロイメンド 生理食塩水	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	デキサート アロキシ 生理食塩水	9.9mg 0.75mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
6	デキサート 生理食塩水	6.6mg 100mL	点滴静注	30分			●	●																		
7	エトポシド ソルデム3A	100mg/m2 500ml	点滴静注	3時間		●	●	●																		
8	硫酸Mg補正液 アスパラカリウム 生理食塩水	20mEq 10mEq 1000mL	点滴静注	500mL/h		●																				
9	20%マンニトール	300ml	点滴静注	1時間		●																				
10	シスプラチン 生理食塩水	80mg/m2 250ml	点滴静注	1時間30分		●																				
11	アスパラギン酸K 生理食塩水	10mEq 500mL	点滴静注	500mL/h		●																				
12	生理食塩水	50mL	点滴静注	30分			●	●																		
13	ヘパリンNaロック10単位/ml	1筒	静注			●	●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									