レジメン名	移植前処置（再生不良性貧血、 Campath使用）				
対象がん種		対象患者	難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	6
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	8.3%	
	FN	25.0%	抗菌薬投与
その他	食欲減退	75.0%	
	倦怠感	66.7%	
	infusion reaction	不明	前投薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1(-6)	2(-5)	3(-4)	4(-3)	5(-2)	6(-1)	7(移植日)
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)						休薬完了	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●			
2	プロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr		●						
3	アロキシ 生食	0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●						
4	フルダラ 生食	30mg/m^2 100mL	点滴静注	30min		●	●	●	●			
5	エンドキサン 生食	25mg/kg 500mL	点滴静注	3hr		●	●	●	●			
6	ポララミン注	5mg	静注			●	●					
7	ソル・メドロール 生食	1mg/kg 50mL	点滴静注	30min		●	●					
8	生食	50mL	点滴静注	200mL/hr		●	●					
9	マブキャンパス 生食	0.125mg/kg 100mL	点滴静注	4hr (初回3mgを2hrで投与、問題なければ残りを2時間で投与)		●						
10	マブキャンパス 生食	0.125mg/kg 100mL	点滴静注	4hr			●					
11	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1(-6)	2(-5)	3(-4)	4(-3)	5(-2)	6(-1)	7(移植日)
1	カロナール	600mg	マブキャンパス30分前			●	●					
2	各種予防薬											