レジメン名	SOX+Nivo				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	未定
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	S-1				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	24.4%	G-CSF製剤
	血小板減少	20.1%	減量・中止・延期
	FN		減量・中止・延期
その他	内分泌障害	13.7%	減量・中止・延期
	肺毒性		減量・中止・延期
	皮膚毒性		減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																			
2	オプジーボ 生食	360 mg 100 ml	点滴静注	1時間		●																			
3	生食	50 ml	点滴静注	100 mL/h		●																			
4	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●																			
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間		●																			
6	生食	50mL	点滴静注	200 mL/h		●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	S-1	80-120mg/day	内服			●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	8 mg/day	内服				●●	●●																		