レジメン名	FOLFOX+Nivo				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	未定
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	24.4%	G-CSF製剤
	血小板減少	20.1%	減量・中止・延期
	FN		減量・中止・延期
その他	内分泌障害	13.7%	減量・中止・延期
	肺毒性	5.1%	減量・中止・延期
	皮膚毒性	27.4%	減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●													
2	オプジーボ 生食	240 mg 100 ml	点滴静注	1時間		●													
3	生食	50 ml	点滴静注	100 mL/h		●													
4	デキサート アロキシ プリンペラン 生食	9.9 mg 0.75mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
5	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	125 mL/h	オキサリプラチン と同時投与	●													
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間	レボホリナートと 同時投与	●													
6	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/㎡ 全量100 mL	持続静注	46時間		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	内服				●●	●●											