レジメン名	DBd療法(9コース目以降)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	PDまで
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	17.7%	休薬、減量など
	血小板減少	58.8%	休薬、減量など
	貧血	26.3%	
その他	infusion reaction	64.2%	予防薬の使用、中断、中止など
	感染症	67.5%	予防薬の使用、中止など
	末梢性ニューロパ	47.3%	休薬、減量、中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																										
2	生食 デキサート ボララミン	50ml 16.5mg 5mg	点滴静注	500ml/h	ダラザレックス開始	●																										
3	生食	50ml	点滴静注	50ml/h		●																										
4	ダラザレックス 生食	16mg/kg 500ml	点滴静注		開始～1時間: 100ml/h 1～2時間: 150ml/h 2時間以降: 200ml/h	●																										
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	アセトアミノフェン	650～1000mg				●																										
2	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	高尿酸血症治療薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●