レジメン名	オプジーボ＋カボメティクス併用療法				
対象がん種	腎細胞がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	14日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	カボメティクス				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		-	
		-	
		-	
その他	高血圧	33.0%	G1になるまで休薬
	下痢	70.0%	G1になるまで休薬
	手足症候群	43.0%	G1になるまで休薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●													
2	オプジーボ 生食	240mg 100mL	点滴静注	1hr		●													
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	カボメティクス錠	40mg/回	1日1回 空腹時			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●