

レジメン名	(BS) リツキシマブ単剤 (2コース目以降)				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	7
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	2~7
				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	55.6%	休薬、G-CSF
	ヘモグロビン減少	20.0%	
	血小板減少	15.6%	
その他			

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●						
2	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●						
3	リツキシマブBS 生理食塩液	375mg/m2 337.5mL/m2	点滴静注	100mg/hから開始可、医師の指示により30分毎100mg/hずつ上げて400mg/hまで		●						
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7
1	イブプロフェン	200mg	リツキサ30分前		●						

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

100 ml/h

②

点滴静注

ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL
---------------	-------------

100 ml/h

③

点滴静注

リツキシマブBS 生理食塩液	375mg/m2 337.5mL/m2
-------------------	------------------------

備考欄参照

④

点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

100 ml/h

軽度起炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

100mg/hから開始可、医師の指示により30分毎100mg/hずつ上げて400mg/hまで

で