

レジメン名	維持ペムブロリズマブ+PEM				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	規定なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	規定なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	貧血	38.0%	
	好中球減少	24.9%	パンビタン内服、メチコバル筋注(9週毎)
	血小板減少	17.0%	
その他	免疫関連有害事象	-	
		-	
		-	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了	
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					
4	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																					
5	アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL	点滴静注	500mL/h			●																					
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	パンビタン末	1g/day	朝食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50mL
----	------

100 ml/h

②

点滴静注

キイトルーダ	200mg
生食	50mL

30分

該当分類なし

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要

③

点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

④

点滴静注

デキサート	6.6mg
生食	100mL

200 ml/h

⑤

点滴静注

アリムタ	500mg/m ²
生食	100mL

500 ml/h

軽度起炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

⑥

点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h