レジメン名	IsaPd療法（2コース目以降）				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	43.4%	休薬することがある
	血小板減少	11.2%	同上
その他	肺炎	15.1%	抗菌薬など
	敗血症	1.3%	同上
	infusion reaction	37.5%	中断、ヒドロコルチゾンなど

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●														●												
2	ガスター ボララミン 生理食塩液	20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分		●														●												
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分		●														●												
4	サークリサ 生理食塩液	10mg/kg 計250mLにする	点滴静注	0-60分（初回175mg/h、2回目以降175mg/h）、60-90分（225mg/h、275mg/h）、90-120分（275mg/h、375mg/h）、120-150分（325mg/h、400mg/h）、150-180分（375mg/h、400mg/h）、180分以降（400mg/h、400mg/h）		●														●												
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●														●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg	サークリサ30分前			●														●												
2	レナデックス	40mg	サークリサ30分前			●							●							●							●						
3	ポマリスト	4mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4	他、適宜抗真菌薬、ST合剤など																																