DLd療法(2コース目のみ)

多発性骨髄腫	対象患者		催吐リスク	軽度
			1コースの日数	28
			投与予定回数	1
あり			投与回数上限	
レブラミド				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	59.4%	休薬、減量（レナリドミド）
	血小板減少	26.9%	休薬、減量（レナリドミド）
	リンパ球減少	6.0%	
その他	Infusion reaction	77.4%	予防薬の使用、中断、中止など
	感染症	86.3%	予防薬の使用、中止など
	間質性肺疾患	0.7%	

再発・難治性多発性骨髄腫）

			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						
50ml 16.5mg 5mg	点滴静注	500ml/h	ダラザレックス開始	●							●							●							●						
50ml	点滴静注	50ml/h		●							●							●							●						
16mg/kg 500ml	点滴静注	開始～1時間： 100ml/h 1～2時間： 150ml/h 2時間以降： 200ml/h		●							●							●							●						
50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						

・難治性多発性骨髄腫）

投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CrCL 61mL/min 以上：25mg、CrCL 30～60mL/min：10mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
20mg（75歳を超える又は過少体重（BMI：18.5kg/m2未満）の患者にはデキサメタゾンを20mg/週で投与することを可とする）					●							●							●							●					
650～1000mg	ダラザレックス開始1～3時間前			●							●							●							●						
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●