レジメン名	CBDCA+PTX3週毎(イメンド併用)				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	3週間
				投与予定回数	3～4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	84.5%	G-CSF投与
	血小板減少	8.6%	輸血
		0.0%	
その他	食欲不振	1.7%	降圧剤の併用
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																				
2	生食 ブロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																				
3	デキサート ガスター ポララミン 生食	9.9mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
5	パクリタキセル 5%　ブドウ糖注	200mg/㎡ 500mL	点滴静注	180mL/h		●																				
6	カルボプラチン 5%　ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4mg　2錠	朝・昼食後				●●	●●																		
2	5-HT_3受容体拮抗薬					●																				