

レジメン名	PER+トラスツズマブ単独（導入）				
対象がん種	乳がん	対象患者	HER2陽性乳癌術後、転移再発	催吐リスク	最小度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
			切除不能進行・再発	投与予定回数	1回(備考欄参照)
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	備考欄参照	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	頭痛	1%以上 鎮痛薬
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上 整腸剤、制吐薬等
	呼吸困難	1%以上 呼吸器内科相談、減量中止を検討

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h	投与時刻(必要時)	●																					休薬完了	
2	バージェタ 生食	840mg 250mL	点滴静注	60分		●																						
3	トラスツズマブBS「NK」 注射用水 生食	8mg/kg 0.38mL/kg 250mL	点滴静注	170mL/h		●																						
4	生食	100mL	点滴静注	100mL/h		●																						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②  
点滴静注

バージェタ	420 mg
生理食塩液	250 ml
	500 ml/h

③  
点滴静注

トラスツズマブBS	6 mg/kg
注射用水	0.28 ml/kg
生理食塩液	250 ml
	1時間

④  
点滴静注

生理食塩液	50 ml
	200 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要