

レジメン名		GEM+DOC(隔週)			
対象がん種	膵がん	対象患者	催吐リスク	軽度	
			1コースの日数	14日	
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	PDまで	
※有の場合薬剤名			投与回数上限	なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	
	好中球減少	
	血小板減少	
その他	皮膚症状	
	発熱	
	浮腫	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50mL	点滴静注	50mL/h		●														
2	デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●														
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖	30mg/m <sup>2</sup> 250mL	点滴静注	1時間		●														
4	ゲムシタピン 生食	1000mg/m <sup>2</sup> 100mL	点滴静注	200mL/h		●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	なし																		

滴下順

主管  
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間  
投与時刻(必要時)

漏出時リスク  
フィルター

遮光  
備考

①  
点滴静注

生食	50mL
	50mL/h

②  
点滴静注

デキサート	6.6mg
ガスター	20mg
ボラミン	5mg
生食	100mL
	200mL/h

③

ドセタキセル	30mg/m <sup>2</sup>
5%ブドウ糖	250mL
	1時間

④

ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>
生食	100mL
	200mL/h

起壊死性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要