レジメン名	キイトルーダ(6週間毎)＋インライタ併用療法				
対象がん種	腎細胞がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	42日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	インライタ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	内分泌障害	39.4%	G1以下になるまで休薬
	胃腸障害	65.5%	G1以下になるまで休薬
	呼吸器障害	35.2%	G1以下になるまで休薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																											
2	キイトルーダ 生食	400mg 50mL	点滴静注	30min		●																											
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																											

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr															
2	キイトルーダ 生食	400mg 50mL	点滴静注	30min															
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	インライタ錠	5mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	インライタ錠	5mg/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●