レジメン名	XELOX+HER 6mg/kg(2回目以降用)				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	カペシタビン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少症	50.0%	
その他	手足症候群	66.7%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100mL/h		●																				
2	ハーセプチン 生食	6mg/kg 250ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生食 アロキシ デキサート	100ml 0.75mg 9.9mg	点滴静注	200mL/h		●																				
4	オキサリプラチン ブドウ糖5%	130mg/㎡ 250ml	点滴静注	2時間		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カペシタビン錠	1000mg/㎡/回	朝・夕食後			●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	4mg/回	朝・昼食後				●●	●●																		