

レジメン名		(2mg/kg)オブジーボ(ニボルマブ)療法			
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	術後化学療法	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	14
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	6
				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	-		
	-		
	-		
その他	GVHD (day 100)	20.0%	ステロイド投与など
	irAE	30.0%	同上
	-		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考(投与時刻、モニターなど)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50mL	点滴静注	30min			●														休薬完了
2	オブジーボ 生食	2mg/kg 50mL	点滴静注	1hr			●														
3	生食	50mL	点滴静注	30min			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1																		

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

オブジーボ 2mg/kg
生食 50mL

1時間

③

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

軽度炎症性

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要