レジメン名	Triweekly DC3週間毎				
対象がん種	子宮体がん	対象患者		催吐リスク	高度
	卵巣がん			1コースの日数	21
	子宮頸がん			投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少（G3以	94.0%	
	血小板減少（G3以	9.0%	
	貧血（G3以上）	11.0%	
その他	感覚性末梢神経障	35.0%	
	脱毛（G2以上）	75.0%	
	下痢（G3以上）	6.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	デキサート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖	60mg/㎡ 250mL	点滴静注	1時間		●																				
4	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC：6 250mL	点滴静注	1時間		●																				
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン	2mg/day	投与前内服			●																				
2	イメンド	125mg/day	投与前内服			●																				
3	イメンド	80mg/day	分1				●	●																		
4	デカドロン	8mg/day	分2				●●	●●																		