レジメン名	ラムシルマブ+wPAC				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	85.3%	
	白血球減少	72.1%	
その他	末梢神経障害	70.6%	
	出血	67.6%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●												
2	ガスター ボララミン デキサート 生食	20mg 5mg 6.6mg 50ml	点滴静注	300ml/h		●							●							●												
3	サイラムザ 生食	8mg/kg 250ml	点滴静注	1時間		●														●												
4	生食	100ml	点滴静注	100ml/h	3コース目以降 400ml/h	●														●												
	生食	50ml	点滴静注	100ml/h									●																			
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/㎡ 250ml	点滴静注	1時間		●							●							●												
6	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															