

レジメン名	トラスツズマブ T				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	確吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	28日
			再発	投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少	2.0%
	好中球減少	6%(Grade≥3)
	貧血	2%(Grade≥3)
その他	神経障害	29%(Grade≥3)
	下痢	4%(Grade≥3)
	筋肉痛	3%(Grade≥3)

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	100 ml/h																															
2	トラスツズマブBS 注射液 生食	2 mg/kg 0.095 ml/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●																												
3	デキサート ガスター ポララミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●																												
4	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																												
5	バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	なし																																		

day 1, 8, 15

滴下順

主観

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

点滴静注

トラスツズマブBS 注射液 生食	2 mg/kg 0.095 ml/kg 250 ml
------------------------	----------------------------------

1時間

③

点滴静注

デキサート ガスター ポララミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
------------------------------	----------------------------------

300 ml/h

④

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

⑤

点滴静注

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m ² 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

起壊死性
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要

day 22

滴下順

主観

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

点滴静注

トラスツズマブBS 注射液 生食	2 mg/kg 0.095 ml/kg 250 ml
------------------------	----------------------------------

250 ml/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要