

レジメン名		後発GEM(標準)3投1休			
対象がん種	胆道がん	対象患者	催吐リスク	軽度	
	膵がん		1コースの日数	28日	
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	PDまで	
※有の場合薬剤名			投与回数上限	なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)(grade≥3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	41.0%
	血小板減少	11.0%
	貧血	14.3%
その他	食欲不振	7.3%
	ALT上昇	15.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●															
2	生食 ゲムシタピン	100 ml 1000mg/m ²	点滴静注	200 ml/h			●							●							●															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	なし																																			

滴下順

主餐

投与方法

①
点滴静注

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

100 ml/h

②
点滴静注

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

ゲムシタピン

1000 mg/m²

生食

100 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要