レジメン名	PBR 1ｺｰｽ目 （ﾎﾟﾗｲﾋﾞｰ・ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ液・ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ） 療法				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	65.7%	休薬することがある
	血小板減少	51.4%	同上
	貧血	45.7%	同上
その他	感染症	40.0%	抗菌薬投与など
	末梢性ニューロパ	14.3%	休薬することがある
	infusion reaction	25.7%	同上

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●	●																		
2	ボララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分		●	●																			
3	リツキシマブ BS 生理食塩液	375mg/m^2 337.5ml/m^2	点滴静注	初回50mg/hから開始、医師の指示により30分毎50mg/hずつ上げて400mg/hまで		●																				
4	ポライビー 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 0.09mL/kg 100mL(体重40kg未満は50mL)	点滴静注	90分			●																			
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分			●																			
6	トレアキシン 生理食塩液	90mg/m^2 250mL	点滴静注	60分			●	●																		
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●	●																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イブプロフェン	200mg	リツキシマブあるいはポライビー30分前			●	●																			
2	カイトリル	2mg	トレアキシン30分前				●	●																		
3	ニューモシスチス予防																									
4	帯状疱疹予防																									